

MS-Info

Fachinformation der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft

Mayzent® (Siponimod)

Mayzent® wird zur Verlaufsbehandlung der Multiplen Sklerose (MS) eingesetzt. Weitere Therapien und Medikamente sind im MS-Info «Behandlung bei MS» beschrieben.

Wirkstoff

Siponimod (Mayzent®) gehört zur Klasse der Sphingosin-1-Phosphat (S1P)-Rezeptor Modulatoren.

Anwendungsbereiche

Bei Erwachsenen mit sekundär progredienter MS (SPMS) mit entzündlicher Krankheitsaktivität.

Kontraindikationen

Immunschwäche, aktive Infektionen, sowie nach einer schweren Infektion des Gehirns (PML). Leberfunktionsstörung, aktive Krebserkrankung, Herzinfarkt (jünger als 6 Monate), instabile Angina pectoris, schwere Herzrhythmusstörung oder Schlaganfall. Spezielle genetische Veranlagung (Genotyp), die für den Abbau von Siponimod benötigt wird. Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff. Bei Schwangerschaft und in der Stillzeit.

Wirkung von Siponimod

Bestimmte weisse Blutkörperchen (Lymphozyten) werden in den Lymphknoten zurückgehalten. Durch die Reduktion der Lymphozyten in den Blutbahnen werden Entzündungen im zentralen Nervensystem (ZNS) reduziert. In der Folge werden die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Behinderung reduziert.

Nebenwirkungen

Die Einleitung der Therapie führt zu einer vorübergehenden Abnahme der Herzfrequenz. Erhöhte Leberwerte, Bluthochdruck, Kopf- und Gliederschmerzen. Infektio-

nen, kleine Haut-Bläschen (Herpes Zoster), Hautveränderungen z.B. Leberflecken, kleine Verfärbungen und Knötchen. Es können Schwindel, Zittern, Übelkeit, Durchfall auftreten. Schwäche, Herzrhythmusstörungen, verschwommenes Sehen (Makulaödem).

Vorsichtsmassnahmen

Bei bestimmten Herz-Vorerkrankungen wird eine engmaschige Überwachung zu Behandlungsbeginn durchgeführt. Vor Beginn der Therapie und nach 6 Stunden der Einnahme findet ein EKG statt. Bei Entwicklung eines Makulaödem wird die Therapie abgesetzt. Vor dem Therapiestart soll ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen, während der Verabreichungsdauer muss eine zuverlässige Verhütungsmethode angewendet werden. Nach Absetzen der Therapie ist eine Steigerung der Krankheitsaktivität möglich und muss überwacht werden.

Verabreichung

Mit Hilfe eines Startersets wird die Dosis über 5 Tage allmählich gesteigert. Am 6. Tag wechseln auf die verordnete Behandlungsdosis. Diese wird vor allem in den ersten 6 Tagen einmal täglich morgens jeweils mit oder ohne Nahrung eingenommen. Wird die Einnahme einer Tablette ausgelassen, sollte mit den behandelnden Neurologen Rücksprache gehalten werden.

damit es besser wird



Schweizerische
Multiple Sklerose
Gesellschaft

Dauer der Therapie

Die Behandlung mit Mayzent® ist als Dauertherapie vorgesehen. Sie kann nach Absprache mit dem Arzt beendet werden.

Wann sollte die Therapie abgebrochen werden

Bei Schwangerschaft, allergischen Reaktionen sowie bei anderweitigen schweren Nebenwirkungen.

Lagerung

Im Kühlschrank lagern (2 bis 8°C). In der Originalverpackung aufbewahren.

ZulassungsinhaberIn

Novartis Pharma (Schweiz) AG
Risch Domizil
6343 Rotkreuz

Kosten

Die Kosten von Mayzent® werden durch die Grundversicherung der Krankenkassen übernommen. Vorgängig reicht der betreuende Facharzt ein Kostengutspracheantrag entweder beim Schweizerischen Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK) oder direkt bei der Krankenversicherung ein. Der Facharzt prüft die Indikation zur Fortsetzung der Therapie jährlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an die Schweiz. MS-Gesellschaft :

MS-Infoline 0844 674 636
(Mo-Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr)

Hinweis

Die Entscheidung, ob Mayzent® eingesetzt werden kann, trifft der Neurologe. Bei Kinderwunsch wird der Neurologe mit Ihnen zusammen über die Durchführung der Therapie entscheiden.

Detaillierte Arzneimittel-Patienteninformationen finden Sie unter www.swissmedinfo.ch

MS Register

Das MS Register ist eine Datensammlung. Sie trägt zum besseren Verständnis der MS und ihrer Behandlung bei und erfasst die Belastung für die Betroffenen und deren Familien mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Weitere Informationen und Anmeldung www.ms-register.ch

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

Josefstrasse 129 / Postfach / 8031 Zürich
Informationen: www.multiplesklerose.ch / 043 444 43 43
info@multiplesklerose.ch

