

Aubagio® (tériflunomide)

Le médicament Aubagio® est utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le traitement par Aubagio®. Pour de plus amples informations sur les médicaments et les traitements disponibles, lisez l'Info-SEP «Traitement de la sclérose en plaques».

L'essentiel en bref

- Aubagio® est utilisé dans le traitement de la SEP évoluant par poussées (forme récurrente-rémittente) chez l'adulte et l'enfant.
- Le médicament ralentit l'évolution de la maladie.
- Il est administré 1x par jour sous forme de comprimé pris par voie orale.

Substance active et effet

Le tériflunomide est une substance active du groupe des immunomodulateurs. La substance active réduit les globules blancs activés (lymphocytes) qui forment une partie du système immunitaire et qui sont coresponsables des inflammations dans le système nerveux central (SNC). Moins de lymphocytes activés signifie moins d'inflammations dans le SNC. En conséquence, le nombre de poussées diminue. La progression du handicap peut être retardée.

Contre-indications

Ne prenez pas ce médicament dans les cas suivants:

- Maladie hépatique ou rénale sévère
- Hypoprotéïnémie (faible taux de protéines dans le sang).
- Système immunitaire fortement affaibli

- Insuffisance médullaire
- Insuffisance en globules et en plaquettes
- Syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ou érythème polymorphe
- Grossesse et allaitement

Effets secondaires possibles

Le tériflunomide peut provoquer les effets secondaires suivants:

- Rhume ou grippe
- Infections des voies urinaires
- Dysesthésie de la peau (fourmillements, picotements, douleurs)
- Diarrhée ou nausées
- Enzymes hépatiques accrues
- Perte des cheveux (alopécie)

La diarrhée, les nausées et la perte des cheveux peuvent apparaître au début du traitement et disparaître de nouveau après. Les cheveux repoussent.

Précautions d'emploi

Le traitement au tériflunomide doit être surveillé par un médecin qui a de l'expérience avec la sclérose en plaques. Avant le début du traitement, il convient de réaliser un test de dépistage de la tuberculose. En outre, le médecin contrôle votre pression artérielle ainsi que les marqueurs hépatiques et réalise un hémogramme complet. Pendant le traitement, la pression artérielle, les marqueurs hépatiques doivent être contrôlés.

Et, en cas de signes infectieux, l'hémogramme complet doit être également contrôlé. Au cours du premier semestre, cette procédure a lieu tous les mois et ensuite à des intervalles de six à huit semaines. Avant une grossesse, le tériflunomide doit être éliminé de l'organisme. Normalement, la substance active persiste entre 8 à 24 mois au maximum dans le corps. Elle peut toutefois être rapidement métabolisée avec du charbon actif par exemple. Le tériflunomide et certaines autres préparations (par ex. le millepertuis) peuvent s'influencer mutuellement dans leur action. Si vous commencez le traitement et qu'à ce moment-là, vous prenez la pilule contraceptive, une dose plus faible vous sera prescrite.

Administration

La dose recommandée d'Aubagio® est d'un comprimé une fois par jour. Vous pouvez prendre ce médicament pendant les repas ou en dehors.

Conservation

À température ambiante (15 à 25 °C).

Durée du traitement

Le traitement est une thérapie à long terme. Consultez votre neurologue si vous souhaitez arrêter le traitement.

Passage à Aubagio®

Il est possible de passer directement de l'interféron bêta ou de l'acétate de glatiramère à Aubagio®. Si vous êtes traité par un autre médicament contre la SEP, un intervalle de sécurité entre les traitements sera examiné.

Voyages

Transportez le médicament dans son emballage d'origine dans le bagage à main. Une carte de médicaments signée par le médecin doit faire partie des bagages.

Coûts

L'assurance de base de la caisse-maladie prend en charge les coûts d'Aubagio®. Votre médecin déposera une demande de garantie de prise en charge auprès de votre caisse-maladie ou de la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK/FSA). Il vérifiera ensuite tous les ans s'il est judicieux de poursuivre le traitement.

La Société suisse SEP est neutre et indépendante. Elle n'accepte aucun soutien financier de l'industrie pharmaceutique.

Remarques

- Si vous souhaitez avoir un enfant, votre neurologue décidera avec vous de la mise en œuvre de la thérapie.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le médicament à l'intention des patients sur www.swissmedicinfo.ch
- Cette Info-SEP concerne les adultes. Lisez également l'Info-SEP «[Traitement de l'évolution pour enfants et adolescents atteints de SEP](#)».
- Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à la Société suisse SEP.

Infoline SEP

0844 737 463

Lu – ve de 9h00 à 13h00



Société suisse de la sclérose en plaques

Rue du Simplon 3 / 1006 Lausanne

Information: www.sclerose-en-plaques.ch / 021 614 80 80

info@sclerose-en-plaques.ch



La Société SEP n'accepte aucun soutien financier de l'industrie pharmaceutique. Nous vous remercions pour votre don !