

Info-SEP

Information spécifique de la Société suisse de la sclérose en plaques

Aubagio® (Tériflunomide)

L'Aubagio® est utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) évoluant par poussées. D'autres traitements et médicaments sont présentés dans l'Info-SEP «Traitement de la sclérose en plaques».

Principe actif

Le tériflunomide (Aubagio®) est un immunomodulateur dont les propriétés sont principalement anti inflammatoires. Il entraîne une inhibition précise et réversible d'une enzyme particulière nécessaire à la prolifération cellulaire (dihydroorotate déshydrogénase).

Indication

Chez l'adulte présentant un diagnostic confirmé de SEP évoluant par poussées (récurrente/ rémittente).

Contre-indications

Maladie rénale ou hépatique grave et hypoprotéïnémie (faible taux de protéines dans le sang). Système immunitaire fortement affaibli, ainsi qu'une insuffisance médullaire ou un faible nombre de globules sanguins (globules rouges, globules blancs ou plaquettes). Patients atteints du syndrome de Stevens-Johnson, du syndrome de Lyell ou d'un érythème polymorphe. L'Aubagio® ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte ou pendant l'allaitement.

Mode d'action du tériflunomide

Le mécanisme d'action exact du tériflunomide dans le cadre de la SEP est encore mal connu. On suppose qu'il réduit le nombre de lymphocytes (globules blancs) activés qui constituent une partie du système immunitaire et qui sont impliqués dans le processus inflammatoire du sys-

tème nerveux central (SNC). La baisse du nombre de lymphocytes activés diminue les inflammations du SNC. La fréquence des poussées est alors réduite et la progression du handicap ralentie.

Effets secondaires

Infection des voies respiratoires supérieures (refroidissement), grippe et infection des voies urinaires. Dysesthésies cutanées telles que fourmillements, picotements ou douleurs. Diarrhée, nausées, augmentation des enzymes hépatiques. Des symptômes transitoires tels que diarrhée, nausées et chute de cheveux peuvent survenir au début du traitement. Les cheveux repoussent ensuite.

Mesures de précaution

Le traitement doit être supervisé par un médecin expérimenté dans la prise en charge de la SEP. Avant le début du traitement, il convient de procéder à un test de dépistage précoce de la tuberculose. En outre, la pression artérielle et les fonctions hépatiques doivent être contrôlées, et un bilan sanguin complet doit être effectué. Pendant le traitement, la pression artérielle et les fonctions hépatiques doivent être contrôlées régulièrement. En cas de symptômes comme par exemple des infections, il convient de procéder régulièrement à un hémogramme complet. Les contrôles doivent être mensuels pendant les six premiers mois, puis il est recommandé de les espacer de six à huit semaines.

Procédure d'élimination accélérée

La prise de tériflunomide pendant la grossesse peut être préjudiciable au fœtus. C'est pourquoi les femmes en âge de procréer doivent utiliser des moyens de contraception fiables. Il convient de prescrire une pilule faiblement dosée aux femmes qui commencent un traitement avec le tériflunomide et débutent la prise d'un contraceptif oral. Si une grossesse est souhaitée ou qu'une grossesse non désirée survient, le traitement doit être immédiatement interrompu. Comme le médicament reste dans le corps en moyenne de huit mois à deux ans maximum, il faut accélérer sa dégradation et déclencher l'élimination de la substance active. Cela est possible par l'administration pendant onze jours de cholestyramine ou de charbon actif. Le tériflunomide n'a guère d'influence sur la qualité du sperme.

Administration

Un comprimé de 14 mg de tériflunomide à avaler une fois par jour en dehors des repas.

Durée du traitement

Il s'agit d'un traitement de longue durée, mais il peut être interrompu à tout moment après en avoir discuté avec votre médecin.

Changement de traitement

L'interféron bêta ou l'acétate de glatiramère ne nécessitent pas de fenêtre thérapeutique. Avec le natalizumab et le fingolimod, il convient de respecter une fenêtre thérapeutique de plusieurs semaines. La transition sera planifiée avec votre neurologue.

Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à la Société suisse de la sclérose en plaques:

Infoline-SEP, 0844 737 463

Du lundi au vendredi de 09h à 13h

Conservation

A température ambiante (15-25 °C)

Voyager avec le médicament

L'Aubagio® doit être transporté dans la boîte d'origine en bagage à main.

Titulaire de l'autorisation d'Aubagio®

sanofi-aventis schweiz ag
1214 Vernier/GE

Coûts

L'Aubagio® est remboursé par la caisse-maladie dans le cadre de l'assurance de base. Le spécialiste qui vous suit transmet au préalable une demande de garantie de prise en charge directement à la caisse-maladie ou à la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK). La ou le spécialiste vérifie chaque année si la prolongation du traitement est indiquée.

Informations professionnelles et informations détaillées destinées aux patientes et patients sous www.swissmedicinfo.ch

Le Registre suisse de la SEP

Le Registre suisse de la SEP permet de documenter la répartition de la maladie en Suisse. Il vise à améliorer la compréhension de la maladie et son traitement en démontrant l'impact sur les personnes atteintes et leurs familles afin d'améliorer leur qualité de vie. Pour plus d'informations et pour vous inscrire www.registre-sep.ch.

Société suisse de la sclérose en plaques

Rue du Simplon 3 / 1006 Lausanne

Information: www.sclerose-en-plaques.ch / 021 614 80 80

info@sclerose-en-plaques.ch

