SEP Société suisse de la sclérose en plaques

Info-SEP

# Vumerity™ (diroximel fumarate)

Le médicament Vumerity™ est utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le traitement par Vumerity™. Pour de plus amples informations sur les médicaments et les traitements disponibles, lisez l'Info-SEP «Traitement de la sclérose en plaques».

## L'essentiel en bref

- Vumerity™ est utilisé dans le traitement de la SEP récurrente-rémittente chez l'adulte.
- Le médicament ralentit l'évolution de la maladie.
- Le médicament est administré par voie orale, sous forme de gélule deux fois par jour.

### Principe actif et effet

Le diroximel fumarate, le principe actif contenu dans Vumerity™, est un dérivé de l'acide fumarique.

Le diroximel fumarate active, dans les cellules de notre corps, la partie du système immunitaire qui agit contre le stress oxydant (toxines cellulaires) et les inflammations. Cela permet de réduire les réactions inflammatoires. De plus, les défenses immunitaires naturelles du système nerveux central sont stimulées contre l'attaque de ces cellules, typique de la SEP. Le nombre de poussées est alors réduit. L'évolution de la maladie peut être ralentie.

### Contre-indications

Ne prenez pas ce médicament dans les cas suivants:

- En cas d'insuffisance rénale ou hépatique, modérée ou sévère
- En cas d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- En cas d'infection active ou chronique sévère comme la tuberculose ou l'hépatite B et C
- En cas de suspicion ou de cas confirmé de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)
- En cas de pathologies sévères de l'estomac ou de l'appareil digestif
- En cas de carences en globules blancs (leucopénie)
- Chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans

Il est recommandé de faire preuve de prudence dans les cas suivants:

- Grossesse et allaitement

### Effets secondaires possibles

Surtout au début du traitement, le diroximel fumarate peut entraîner les effets secondaires suivants:

- Flush (rougeurs sur le visage et le corps, bouffées de chaleur, sensations anormales de chaleur ou de brûlure, démangeaisons)
- Douleurs ou crampes digestives accompagnées de symptômes tels que diarrhée, nausées et vomissements

### Autres effets secondaires possibles:

- Apparition de protéines (albumine) dans les urines (protéinurie)
- Carences en globules blancs dans le sang (leucopénie)
- Augmentation du taux d'enzyme hépatique dans le sang
- Zona

Il n'existe aucune étude concernant l'influence du principe actif sur la qualité du sperme.

Des cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) ont été observés lors de l'utilisation d'une substance active comparable. Il s'agit d'une infection virale rare mais grave et potentiellement mortelle. Si une LEMP est suspectée, il convient de procéder immédiatement à un examen.

**Mesures de précaution**
Vumerity™ peut modifier le nombre de globules blancs ainsi que le taux de marqueurs rénaux et hépatiques dans le sang. Des bilans sanguins et des analyses de foie et de reins doivent être réalisés au début du traitement, puis à intervalles réguliers.

Concernant les vaccinations avec certains vaccins (vaccins vivants atténués), il est recommandé de consulter votre neurologue au préalable.

**Administration**
La posologie recommandée est de deux gélules de Vumerity™ deux fois par jour (4x 231 mg). Ingérez la gélule entière avec un peu d'eau au cours d'un repas peu calorique et relativement faible en matières grasses, peut réduire quelque peu les possibles effets secondaires.

Pendant les sept premiers jours du traitement, prenez une gélule de 231 mg deux fois par jour.

**Conservation**
Conserver à une température ambiante de 25 °C max. dans l'emballage d'origine.

**Durée du traitement**
Le traitement est une thérapie à long terme. Consultez votre neurologue si vous souhaitez arrêter le traitement.

**Changement de traitement pour Vumerity™**
Il est possible de passer directement de l'interféron bêta ou de l'acétate de glatiramère à Vumerity™. Si vous êtes traité par un autre médicament contre la SEP, une marge de sécurité entre les traitements sera examinée.

**Voyages**
Transportez le médicament dans son emballage d'origine dans le bagage à main. Un passeport médicaments signé par le médecin doit l'accompagner.

**Coûts**
L'assurance de base de la caisse-maladie prend en charge les coûts de Vumerity™. Votre médecin déposera une demande de garantie de prise en charge auprès de votre caisse-maladie ou de la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK/FSA). Il vérifiera ensuite tous les ans s'il est judicieux de poursuivre le traitement.

Infoline SEP
**0844 737 463**
Lu – ve de 9h00 à 13h00

**Remarques**
- En cas de désir d'enfant, le neurologue discutera avec vous de la réalisation du traitement.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le médicament à l'intention des patients sur www.swissmedicinfo.ch
- Cette Info-SEP concerne les adultes. Lisez également l'Info-SEP «Traitement de l'évolution pour enfants et adolescents atteints de SEP».
- Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à la Société suisse SEP.

05/2023

Société suisse de la sclérose en plaques
Rue du Simplon 3 / 1006 Lausanne
Information: www sclerose-en-plaques.ch / 021 614 80 80
info@sclerose-en-plaques.ch

La Société SEP n'accepte aucun soutien financier de l'industrie pharmaceutique. Nous vous remercions pour votre don !