

## Médicament contre la NMOSD: Ultomiris® (ravulizumab)

Le médicament Ultomiris® est utilisé dans le traitement des maladies du spectre de la neuromyéélite optique (NMOSD). Vous trouverez ici toutes les informations importantes au sujet du traitement par Ultomiris®. Pour plus d'informations sur la NMOSD et son traitement, veuillez consulter le site internet de la Société suisse SEP.

---

### L'essentiel en bref

- Ultomiris® est utilisé pour traiter la NMOSD (avec des anticorps anti-aquaporine-4).
  - Ce médicament est autorisé pour les adultes.
  - Lorsque le traitement est efficace, celui-ci peut freiner, voire arrêter l'évolution de la maladie.
  - Il est administré par perfusion toutes les huit semaines.
- 

### Principe actif et effet

Le principe actif contenu dans Ultomiris®, le ravulizumab, est un anticorps monoclonal qui peut se lier à une protéine spécifique du système du complément (une partie des défenses immunitaires de l'organisme). Dans le cadre du traitement de la NMOSD, le principe actif agit sur le système immunitaire afin de réduire le nombre de poussées. La progression de la maladie peut alors être ralentie.

### Contre-indications

Ce médicament est déconseillé dans les situations suivantes:

- hypersensibilité au ravulizumab ou à un excipient du médicament
- infections actives

Il est recommandé de faire preuve de prudence dans les cas suivants:

- grossesse et allaitement

### Effets secondaires possibles

Le ravulizumab peut provoquer les effets secondaires suivants (liste non exhaustive):

- sensibilité accrue aux infections
- réactions liées à la perfusion

- maux de tête
- diarrhée

### **Effets indésirables très rares**

Une sensibilité accrue aux infections à méningocoques peut survenir au cours d'un traitement par Ultomiris®. Une vaccination contre les méningocoques est donc nécessaire. A titre préventif, un traitement antibiotique supplémentaire peut s'avérer nécessaire jusqu'à ce que la vaccination soit pleinement efficace.

### **Mesures de précaution**

Afin de minimiser les risques éventuels, il est nécessaire de mettre en place les mesures suivantes:

- Effectuer des analyses sanguines spécifiques, des examens médicaux ainsi que d'éventuelles vaccinations avant le début du traitement.
- Les vaccins vivants sont contre-indiqués avec Ultomiris®. Si une vaccination par vaccin vivant est nécessaire, discutez-en au cas par cas avec votre médecin.
- Des contrôles sanguins et cardiovasculaires seront régulièrement réalisés au début du traitement et pendant le traitement.
- Informez vos professionnel-le-s de la santé de votre traitement par Ultomiris® et gardez sur vous une attestation de traitement (carte ou application)

### **Posologie**

Les deux premières perfusions sont administrées à deux semaines d'intervalle, puis le médicament est administré toutes les huit semaines. La posologie est calculée en fonction de votre poids.

### **Durée du traitement**

Le traitement est une thérapie à long terme. Si vous souhaitez interrompre le traitement, veuillez consulter votre neurologue.

### **Voyages**

- Un passeport médical ou une attestation de traitement signée par le ou la médecin doit être conservée dans le bagage à main.

## Coûts

Ultomiris® est remboursé par la caisse-maladie dans le cadre de l'assurance de base, après déduction de la franchise et de la quote-part.

## Remarques

Si vous souhaitez avoir un enfant, votre neurologue discutera avec vous s'il convient de poursuivre le traitement.

Vous trouverez des informations détaillées sur le médicament à l'intention des patient-e-s sur [www.compendium.ch](http://www.compendium.ch)

Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin traitant ou à la Société suisse SEP.

Infoline SEP: 021 614 80 80, lun – ven de 9h00 à 13h00



La Société SEP n'accepte aucun soutien financier de l'industrie pharmaceutique. Nous vous remercions pour votre don !