

Explications des critères de McDonald 2017

	Présentation clinique	Lésions	Paramètres supplémentaires devant être constatés pour un diagnostic de la SEP
SEP avec évolution par poussées (forme récurrente-rémittente, SEP-RR)			
1	≥ 2 poussées cliniquement prouvées	≥ 2	aucun
2	≥ 2 poussées cliniquement prouvées	1 ¹	aucun
3	≥ 2 poussées cliniquement prouvées	1	Dissémination spatiale soit une poussée cliniquement prouvée liée à une deuxième lésion cliniquement prouvée et séparée spatialement ou une preuve de dissémination spatiale visible lors de l'IRM
4	1 poussée cliniquement prouvée	≥ 2	Dissémination temporelle soit une poussée supplémentaire cliniquement prouvée ou une preuve de dissémination temporelle visible lors de l'IRM ou des bandes oligoclonales dans le liquide céphalorachidien qui n'apparaissent pas dans le sérum
5	1 poussée cliniquement prouvée	1	Dissémination spatiale ET temporelle
SEP primaire progressive (SEP-PP)			
6	≥ 1 an de progression clinique du handicap sans poussée		Au moins deux des trois points suivants s'appliquent: - au moins une lésion en T2: périventriculaire, corticale/juxtacorticale ou infratentorielle. - au moins deux lésions en T2 visibles lors de l'IRM du rachis - détection de bandes oligoclonales d'IgG dans le liquide céphalorachidien

¹ ainsi que des indices d'une poussée antérieure sur la base d'une lésion clairement localisable