



Aubagio® (teriflunomide)

Il farmaco Aubagio® viene impiegato per il trattamento della forma recidivante-remittente della sclerosi multipla. Qui sono riportate tutte le principali informazioni sulla terapia con Aubagio®. Per ulteriori informazioni su medicamenti e terapie consultare il foglio informativo sulla SM «Trattamento della sclerosi multipla».

I punti più importanti in sintesi

- Aubagio® viene impiegato negli adulti e nei bambini con sclerosi multipla recidivante-remittente.
- Il medicamento rallenta il decorso della malattia.
- Viene assunto in forma di compressa.

Principio attivo ed effetto

Il teriflunomide è un principio attivo appartenente al gruppo degli immunomodulatori. Il principio attivo riduce i globuli bianchi attivati (linfociti), che fanno parte del sistema immunitario e sono in parte responsabili dell'infiammazione del sistema nervoso centrale (SNC). Meno linfociti attivati significano meno infiammazione nel SNC. Di conseguenza, il numero di ricadute si riduce e la progressione dell'inabilità può essere ritardata..

Controindicazioni

Il farmaco non può essere assunto in caso di:

- Grave patologia epatica o renale
- Ipoproteinemia (bassa concentrazione di proteine nel sangue)
- Sistema immunitario fortemente compromesso
- Funzionalità ridotta del midollo osseo
- Conta dei globuli o piastrinica insufficiente
- Sindrome di Stevens-Johnson, sindrome di Lyell o eritema multiforme
- Gravidanza e allattamento

Possibili effetti collaterali

Il teriflunomide può avere i seguenti effetti collaterali:

- Raffreddore o influenza
- Infezioni delle vie urinarie
- Disestesie cutanee (formicolii, pizzicore, dolori)
- Diarrea o nausea
- Valori aumentati degli enzimi epatici
- Caduta dei capelli (alopecia)

Diarrea, nausea e caduta dei capelli possono manifestarsi all'inizio della terapia per poi scomparire. I capelli ricrescono.

Misure precauzionali

La terapia con il teriflunomide deve essere monitorata da un medico con esperienza di sclerosi multipla. Prima dell'inizio del trattamento, è necessario effettuare uno screening preventivo per la tubercolosi. Il medico controlla inoltre la pressione sanguigna e i valori epatici e traccia un quadro ematologico completo. Durante il trattamento, devono essere controllati la pressione sanguigna, i valori epatici e, in caso di sintomi di infezione, anche la conta ematica totale. Nel primo semestre ciò avviene mensilmente, poi a intervalli di sei-otto settimane. Prima della gravidanza, il teriflunomide deve essere espulso dall'organismo. Normalmente, il principio attivo rimane nell'organismo per un periodo compreso tra otto e 24 mesi al massimo; può tuttavia essere eliminato rapidamente, ad es. con il carbone attivo. Se iniziate la terapia mentre state assumendo la pillola anticoncezionale, ve ne verrà prescritta una con dosaggio più leggero.

La dose raccomandata di Aubagio[®] è di una compressa una volta al giorno. Il farmaco può essere assunto a stomaco pieno o vuoto e va deglutito senza masticare.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Durata della terapia

Il trattamento è previsto come terapia a lungo termine. Consultare il neurologo se si desidera interrompere la terapia.

Passaggio ad Aubagio®

È consentito passare direttamente da interferone beta o glatiramer acetato ad Aubagio[®]. Se il paziente è in trattamento con un altro farmaco per la progressione della SM, verrà valutato un intervallo di sicurezza tra le terapie. Il passaggio va pianificato insieme al proprio neurologo.

In viaggio

Trasportare il farmaco nel bagaglio a mano all'interno della confezione originale. Nel bagaglio deve essere incluso il passaporto dei medicamenti firmato da un medico.

Costi

L'assicurazione di base della cassa malati copre i costi di Aubagio[®]. Il vostro medico specialista richiede una garanzia di assunzione dei costi alla vostra cassa malati o alla Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK). Il medico verifica annualmente le indicazioni e il prosieguo della terapia.

La Società svizzera SM opera in modo neutrale e indipendente. Non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica.

Note

- Se desiderate avere figli, il vostro neurologo deciderà insieme a voi se effettuare la terapia.
- Potete trovare informazioni dettagliate sui farmaci sul sito www.swissmedicinfo.ch
- Questo foglio informativo si riferisce agli adulti.
 Leggete anche l'Info-SM «<u>Terapia che agisce sul</u> decorso per bambini e adolescenti con SM».
- Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro medico curante o alla Società SM.

Infoline SM

091 922 61 10

Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 (chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

Società svizzera sclerosi multipla Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno Informazioni: www sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10 info@sclerosi-multipla.ch





La Società SM non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!