



Avonex® (interferone beta-1a)

Il medicamento Avonex® viene impiegato per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente. Qui sono riportate tutte le principali informazioni sulla terapia con Avonex®. Per ulteriori informazioni su farmaci e terapie consultare l'Info-SM «Trattamento della sclerosi multipla».

I punti più importanti in sintesi

- Avonex® è utilizzato negli adulti e nei bambini con sclerosi multipla recidivante-remittente.
- Il medicamento rallenta il decorso della malattia.
- Viene somministrato una volta alla settimana per via intramuscolare (autosomministrazione).

Principio attivo ed effetto

Gli interferoni beta-1a sono molecole proteiche prodotte naturalmente dal nostro corpo. Trasmettono informazioni tra le cellule del sistema immunitario e regolano i meccanismi di difesa dell'organismo. Sono coinvolti nei processi infiammatori. Somministrato come medicamento per la SM, l'interferone beta-1a influenza il sistema immunitario in modo tale da rallentare il decorso della malattia.

Controindicazioni

Il farmaco non può essere assunto in caso di:

- Allergia ai componenti del preparato
- Forte depressione e pensieri suicidi

È richiesta particolare prudenza in caso di:

- Disfunzioni epatiche (del fegato)
- Epilessia
- Altre malattie autoimmuni
- Gravidanza e allattamento

Possibili effetti collaterali

L'interferone beta-1a può avere i seguenti effetti collaterali:

- Sintomi simili a quelli dell'influenza soprattutto all'inizio della terapia (ad es. febbre, brividi, dolori muscolari, malessere, sudorazioni improvvise)
- Alterazioni del quadro ematologico e dei valori epatici

Non vi sono studi relativi all'influenza dell'interferone beta-1a sulla qualità dello sperma.

Precauzioni

I controlli ematici devono essere eseguiti all'inizio della terapia e successivamente a intervalli regolari.

Somministrazione

La dose raccomandata di Avonex® è di 30 µg una volta alla settimana. Il medicamento viene iniettato nel muscolo della coscia (via intramuscolare) tramite iniezione pronta all'uso o penna preimpilata, oppure in alternativa anche nel braccio o sulle natiche. Al fine di avvertire il meno possibile gli effetti collaterali, è consigliabile eseguire l'iniezione alla sera.

In genere la persona impara a iniettarsi autonomamente il medicamento. In casi isolati il compito viene affidato al servizio Spitex o ai familiari.

Istruzioni per l'uso

Un infermiere specializzato spiega come utilizzare le siringhe o la penna. Grazie a istruzioni ottimali

si possono limitare il più possibile gli effetti collaterali e i problemi legati all'iniezione. L'infermiere specializzato fornisce assistenza anche nel prosieguo della terapia. Le istruzioni possono essere impartite dall'infermiere specializzato della Società SM, dal medico curante o da altri assistenti per la SM.

Strumenti

Tutti gli strumenti (ad es. contenitore per lo smaltimento degli aghi usati) e la documentazione vengono messi gratuitamente a disposizione dal produttore.

Conservazione

Avonex® è disponibile in due diverse forme di somministrazione:

- Iniezione pronta all'uso
- Penna pronta all'uso da 0,5 ml.

Avonex® va conservato in frigorifero (2-8 °C). Eccezionalmente può essere conservato fino a 7 giorni a temperatura ambiente (max. 30 °C).

Durata della terapia

Il trattamento è previsto come terapia a lungo termine. Consultare il neurologo se si desidera interrompere la terapia.

Passaggio ad Avonex®

Se il paziente è in trattamento con un altro farmaco per la progressione della SM, verrà preso in considerazione un intervallo di sicurezza tra le terapie.

In viaggio

- Possibilmente trasportare il farmaco nel bagaglio a mano all'interno della confezione originale.
- Si raccomanda di portare con sé un passaporto dei medicinali firmato dal medico.
- Il materiale utilizzato per l'iniezione deve essere smaltito in maniera corretta.

Costi

L'assicurazione di base della cassa malati copre i costi di Avonex®. Il vostro medico specialista richiede una garanzia di assunzione dei costi alla vostra cassa malati o alla Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK). Il medico verifica annualmente le indicazioni e il prosieguo della terapia.

La Società svizzera SM opera in modo neutrale e indipendente. Non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica.

Note

- In caso di desiderio di maternità, il neurologo deciderà assieme alla paziente in merito all'esecuzione della terapia.
- Questo foglio informativo si riferisce agli adulti. Leggete anche l'Info-SM «Terapia che agisce sul decorso per bambini e adolescenti con SM».
- Potete trovare informazioni dettagliate sui farmaci sul sito www.swissmedicinof.ch
- Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro medico curante o alla Società SM.

Infoline SM

091 922 61 10

Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)



Società svizzera sclerosi multipla

Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno

Informazioni: www.sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10

info@sclerosi-multipla.ch



La Società SM non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica. Grazie per la Vostra donazione!