Società svizzera sclerosi multipla

Info-SM

Biosimilare di natalizumab

Tyruko®, biosimilare di natalizumab, viene impiegato per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente. Qui sono riportate tutte le principali informazioni sulla terapia con questo biosimilare di natalizumab. Per ulteriori informazioni su medicamenti e terapie si prega di consultare l'Info-SM «Trattamento della sclerosi multipla».

I punti più importanti in sintesi

- Il biosimilare di natalizumab è utilizzato negli adulti con SM recidivante-remittente in fase attiva.
- Per chi risponde bene al trattamento, questo medicamento può rallentare o addirittura arrestare il decorso della malattia.
- Viene somministrato ogni 28 giorni tramite infusione da personale specializzato.

Principio attivo ed effetto

Il principio attivo natalizumab appartiene alla classe degli inibitori selettivi delle molecole di adesione.

Il natalizumab inibisce l'infiltrazione di determinati immunociti nel sistema nervoso centrale. In questo modo previene la formazione di focolai infiammatori.

Campi di applicazione

Il natalizumab è indicato per il trattamento di sclerosi multipla con decorso recidivante-remittente in fase attiva con stato negativo degli anticorpi anti-JCV.

Controindicazioni

Il farmaco non può essere assunto in caso di:

- Ipersensibilità verso il principio attivo e gli eccipienti
- Sistema immunitario indebolito
- In seguito a leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML)

È richiesta particolare attenzione in caso di:

- Gravidanza e allattamento

Possibili effetti collaterali

Raramente, il natalizumab può causare i seguenti effetti collaterali:

- Reazione allergica all'infusione
- Cefalee, vertigini, vomito, nausea
- Infezioni del tratto urinario, infezioni rinofaringee
- Prurito
- Caduta dei capelli (alopecia)
- Dolori articolari, rigidità muscolare, febbre, spossatezza

Altri effetti indesiderati molto rari:

- Durante la terapia con il biosimilare di natalizumab è possibile contrarre un'infezione virale estremamente rara, ma grave e potenzialmente fatale: la leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML).

Misure precauzionali

Prima di iniziare la terapia deve essere disponibile una risonanza magnetica recente, eseguita negli ultimi 3 mesi.

Una precedente cura con immunosoppressori (medicamenti che neutralizzano il sistema immunitario) così come la durata del trattamento con il natalizumab aumentano il rischio di una PML. Con

un test degli anticorpi JC è possibile verificare se una persona è portatrice del virus JC. Il rischio di sviluppare una PML in persone che non hanno anticorpi JC appare molto più basso.

Per individuare tempestivamente un'eventuale PML, a intervalli regolari vengono effettuati controlli del sangue (test degli anticorpi JC) e controlli neurologici. Le persone sottoposte a trattamento con il biosimilare di natalizumab vengono informate sui sintomi, mentre al sospetto di PML si eseguono accertamenti immediati.

Le persone interessate ricevono un passaporto dei medicamenti.

Somministrazione
La dose raccomandata del biosimilare di natalizumab è di 300 mg. Il medicamento viene somministrato ogni quattro settimane per mezzo di un'infusione della durata di almeno 2 ore. La somministrazione deve essere eseguita da personale specializzato in un ambulatorio di neurologia o in una clinica.

Durata della terapia
Il trattamento è previsto come terapia permanente. Consultare il proprio neurologo qualora si desideri interrompere la terapia.

Passaggio ai medicamenti a base di natalizumab
Per le persone trattate con un altro farmaco per la SM, si valuta un intervallo di sicurezza tra le terapie.

Viaggi
Il passaporto dei medicamenti va messo nel bagaglio a mano.

La Società svizzera SM opera in modo neutrale e indipendente. Non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica.

Costi
L'assicurazione di base delle casse malati copre i costi del biosimilare di natalizumab, al netto di franchigia e aliquota percentuale.

Note
- In caso di desiderio di maternità, il neurologo deciderà assieme alla paziente in merito all'esecuzione della terapia.
- Potete trovare informazioni dettagliate sui farmaci destinate ai pazienti sul sito www.swissmedicinfo.ch
- Questo foglio informativo si riferisce agli adulti. Leggete anche l'Info-SM «Terapia che agisce sul decorso per bambini e adolescenti con SM».

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro medico curante o alla Società svizzera SM.

Infoline SM
091 922 61 10
Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

09/2025

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
Informazioni: www.sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch

La Società SM non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica. Grazie per la Vostra donazione!