



## Fingolimod Generici

I generici di Fingolimod trattano il decorso della sclerosi multipla recidivante-remit-tente. Qui troverete tutto ciò che c'è da sapere sul trattamento con questi farmaci fingolimod. Per ulteriori informazioni su medicinali e terapie, consultare l'Info-SM «Trattamento della sclerosi multipla».

---

### I punti più importanti in sintesi

- I generici di fingolimod trattano il decorso recidivante-remit-tente della sclerosi multipla negli adulti.
- Il medicamento rallenta il decorso della malattia.
- Va assunto una volta al giorno sotto forma di capsule.

---

### Principio attivo ed effetto

Il principio attivo fingolimod appartiene alla classe dei modulatori dei recettori della sфинosina 1-fosfato (S1P). Fingolimod protegge il sistema nervoso centrale (SNC) dagli attacchi anomali di alcuni globuli bianchi del sistema immunitario (linfociti) che si manifestano nella SM. I linfociti vengono trattenuti nei linfonodi. La riduzione dei linfociti nella circolazione sanguigna riduce l'infiammazione nel SNC. Di conseguenza, il numero di attacchi si riduce e la progressione dell'invalidità può essere rallentata. Una volta sospesa la terapia, i linfociti tornano normalmente nel flusso sanguigno. Dopo 4-8 settimane dalla conclusione della terapia, il numero di linfociti nel sangue torna al livello originario.

### Controindicazioni

Il farmaco non può essere assunto in caso di:

- Infarto cardiaco (negli ultimi sei mesi), angina pectoris instabile o ictus

- Alcuni tipi di aritmie cardiache e aritmie cardiache gravi
- Insufficienza epatica moderata o grave / cirrosi epatica
- Infezioni gravi acute o croniche e patologie maligne attive
- Presenza di edema maculare (tumefazione di una porzione della retina, visibile sul fondo oculare)
- Gravidanza e allattamento

### Possibili effetti collaterali

Il fingolimod può avere i seguenti effetti collaterali:

- Infezioni delle vie respiratorie
- Temporanea riduzione della frequenza cardiaca e disturbi della conduzione cardiaca
- Ipertensione arteriosa
- Edema maculare (tumefazione di una porzione della retina, visibile sul fondo oculare)
- Innalzamento dei valori epatici
- Abbassamento della conta dei globuli bianchi

Altri possibili effetti collaterali:

- Infezioni da virus influenzali (con sintomi come stanchezza, brividi, mal di gola, dolori articolari o muscolari, febbre, mal di testa, mal di schiena, tosse)
- Infezioni da Herpesvirus
- Depressione
- Sinusite
- Infiammazione gastrointestinale (vomito, nausea, diarrea)

Durante la terapia con un farmaco fingolimod è possibile contrarre un'infezione virale estremamente rara, ma grave e potenzialmente fatale: la leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML). In caso di sospetta PML si raccomanda di effettuare immediatamente degli accertamenti.

### Misure precauzionali

La prima assunzione di un farmaco fingolimod viene monitorata mediante l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) prima e dopo sei ore dall'assunzione della prima capsula del farmaco. Durante questa fase di monitoraggio di sei ore si controllano ogni ora frequenza cardiaca e pressione arteriosa. I valori epatici e la conta ematica vengono controllati prima e dopo l'inizio della terapia a cadenza regolare. Prima dell'inizio del trattamento, così come tre/quattro mesi dopo, si esegue una visita oculistica. Prima di cominciare la terapia si valuta se sottoporre il paziente a un esame della cute e alla vaccinazione contro alcuni tipi di Herpesvirus. Le donne in età fertile devono utilizzare metodi contraccettivi sicuri durante il trattamento e per due mesi dopo la fine dello stesso. Se si interrompe l'assunzione del farmaco fingolimod nelle prime quattro settimane dall'inizio della terapia, è necessario pianificare la ripresa del trattamento con il neurologo.

Dopo le prime quattro settimane, è sufficiente pianificare il reinserimento solo dopo un'interruzione di due o più settimane.

### Somministrazione

La dose raccomandata di un farmaco fingolimod è di una capsula (0,5 mg) al giorno. La capsula può essere assunta a stomaco pieno o vuoto. La prima assunzione deve avvenire sotto controllo medico.

### Conservazione

Conservare nella confezione originale a una temperatura massima di 25 °C.

### Durata della terapia

Il trattamento è previsto come terapia a lungo termine. Consultare il neurologo se si desidera interrompere la terapia.

### Passaggio a un farmaco fingolimod

È consentito passare direttamente da interferone beta, glatiramer acetato o dimetilfumarato ai generici di fingolimod. Se il paziente è in trattamento con un altro farmaco per la progressione della SM, verrà valutato un intervallo di sicurezza tra le terapie.

### In viaggio

Trasportare il farmaco nel bagaglio a mano all'interno della confezione originale. Nel bagaglio deve essere incluso il passaporto dei medicinali firmato da un medico.

### Costi

L'assicurazione di base della cassa malati copre i costi del Fingolimod generico, meno la franchigia e l'eccedenza.

Infoline SM

**091 922 61 10**

Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00  
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

### Note

- In caso di desiderio di maternità, il neurologo deciderà assieme alla paziente in merito all'esecuzione della terapia.
- Potete trovare informazioni dettagliate sui farmaci sul sito [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch)
- Questo foglio informativo si riferisce agli adulti. Leggete anche l'Info-SM «Terapia che agisce sul decorso per bambini e adolescenti con SM».
- Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro medico curante o alla Società SM.




Società svizzera sclerosi multipla

Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno

Informazioni: [www.sclerosi-multipla.ch](http://www.sclerosi-multipla.ch) / 091 922 61 10

[info@sclerosi-multipla.ch](mailto:info@sclerosi-multipla.ch)



La Società SM non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica. Grazie per la Vostra donazione!