

Spiegazione dei criteri di McDonald 2017

	Presentazione clinica	Lesioni	Dati aggiuntivi necessari per la diagnosi di SM
SM recidivante-remittente («relapsing-remitting», RRMS)			
1	≥ 2 ricadute clinicamente provate	≥ 2	Nessuno
2	≥ 2 ricadute clinicamente provate	1 ¹	Nessuno
3	≥ 2 ricadute clinicamente provate	1	Disseminazione spaziale Si tratta o di un attacco clinicamente provato legato a una seconda lesione separata dal punto di vista spaziale o della prova della disseminazione spaziale visibile nella RMT
4	1 ricaduta clinicamente provata	≥ 2	Disseminazione temporale Si tratta o di un'ulteriore ricaduta clinicamente provata o della prova della disseminazione temporale nella RMT o ancora di bande oligoclonali nel liquido cerebrospinale non presenti nel siero
5	1 ricaduta clinicamente provata	1	Disseminazione spaziale E temporale
SM primaria progressiva (SMPP)			
6	≥ 1 anno di progressione clinica dell'invalidità senza attacchi		Presenza di almeno due dei seguenti tre punti: - almeno una lesione T2 periventricolare, corticale/juxtacorticale o infratentoriale - almeno 2 lesioni T2 visibili nella RMT spinale - prova della presenza di bande oligoclonali IgG nel liquido cerebrospinale

¹ oltre a evidenziare un attacco precedente basato su una lesione chiaramente localizzabile